

Bewertung und Qualitätssicherung refraktiv-chirurgischer Eingriffe durch die DOG und den BVA – KRC-Empfehlungen

Stand Februar 2019

Einleitung

Die refraktive Chirurgie umfasst operative Techniken, die noch nicht als allgemein anerkannte Heilverfahren bezeichnet werden können. Deshalb halten sowohl die Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft (DOG) als auch der Berufsverband der Augenärzte Deutschlands (BVA) eine aktualisierte Bewertung der refraktiv-chirurgischen Verfahren für unerlässlich. Darüber hinaus sollten die vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Maßnahmen zur Sicherung der Qualität ärztlichen Handelns (SGB V) in Form einer überprüfbaren Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität festgeschrieben werden. Die Veröffentlichung dieser Empfehlungen (damals Richtlinien) erfolgte erstmals im Juni 1995 (DER AUGENARZT, 3/95, 77-80).

Kommission Refraktive Chirurgie

Die Kommission Refraktive Chirurgie (KRC) wurde 1995 als gemeinsame Kommission der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft (DOG) und des Berufsverbandes der Augenärzte Deutschlands (BVA) eingesetzt.

Der KRC gehören derzeit an:

Prof. Dr. Thomas Kohnen, Frankfurt (1. Vorsitzender); Prof. Dr. Ekkehard Fabian, Rosenheim (2. Vorsitzender); Prof. Dr. Michael C. Knorz, Mannheim (Schriftführer); Prof. Dr. Gerd Auffarth, Heidelberg; Prof. Dr. Gernot I. W. Duncker, Halle/Saale; Prof. Dr. Daniel Kook, München; Prof. Dr. Markus Kohlhaas, Dortmund; Dr. Kaweh Schayan-Araghi, Dillenburg.

Die KRC hat im Einvernehmen mit den Vorständen der DOG und des BVA die Aufgaben:

1. eine aktuelle Bewertung der bekannten refraktiv-chirurgischen Eingriffe nach dem jeweiligen Stand der Wissenschaft vorzunehmen;
2. im Vorgriff auf die von der Bundesärztekammer geforderte Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität entsprechende Empfehlungen zur Qualitätssicherung der neuen Verfahren zu erarbeiten;
3. theoretische und praktische Kurse gemäß der KRC - Empfehlungen zur Qualitätssicherung durchzuführen.

Kommission Refraktive Chirurgie der DOG und des BVA

1. Vorsitzender: Prof. Dr. T. Kohnen **2. Vorsitzender:** Prof. Dr. E. Fabian **Schriftführer:** Prof. Dr. M.C. Knorz

Geschäftsanschrift:

Berufsverband der Augenärzte Deutschlands (BVA) e.V., Stichwort KRC, Postfach 30 01 55, 40401 Düsseldorf
Fon 0211 - 4303700 FAX 0211 - 4303720
e-mail: krc@augeninfo.de
Internet: <http://www.aad.to/krc/>

Beurteilung refraktiv-chirurgischer Eingriffe

Zur Beurteilung der refraktiv-chirurgischen Eingriffe werden für jeden Eingriff anhand der in der wissenschaftlichen Literatur publizierten Arbeiten folgende Kriterien dargestellt:

- Beschreibung
- Anwendungsbereich und Grenzbereich
- Nebenwirkungen

Anwendungsbereich ist im Sinne dieser Empfehlungen der Bereich, in dem das jeweilige Verfahren als geeignet anzusehen ist und Nebenwirkungen selten sind. Es gelten die üblichen Anforderungen an die Aufklärung der Patienten.

Grenzbereich im Sinne dieser Empfehlungen ist der Bereich, in dem das jeweilige Verfahren noch angewendet werden kann, aber mit zunehmend schlechteren Ergebnissen und häufigeren Nebenwirkungen. Für den Grenzbereich gelten erhöhte Anforderungen an die Aufklärung der Patienten.

Außerhalb des Anwendungs- und Grenzbereiches ist die Anwendung des jeweiligen Verfahrens nicht empfehlenswert. Gleiches gilt für sämtliche refraktiv-chirurgische Verfahren, die nicht ausdrücklich in diesen Empfehlungen bewertet wurden. Sollte dennoch eine Anwendung erfolgen, so ist bei der Aufklärung ausdrücklich auf die Anwendung außerhalb des empfohlenen Grenzbereiches hinzuweisen und/oder eine Genehmigung der Ethikkommission im Rahmen einer Studie einzuholen.

1. Excimer-Laser Korrektur von Brechkraftfehlern

Mit sog. Excimer-Lasern lassen sich extrem dünne Gewebeschichten je Laserpuls abtragen. Durch die geeignete Aneinanderreihung vieler solcher Pulse in der Fläche und der Tiefe des Hornhautgewebes lässt sich die Hornhautoberfläche über einen bestimmten Bereich so formen, dass sich ihre Brechkraft verändert. Dies ermöglicht die Korrektur von Brechungsfehlern des gesamten Auges.

Die Excimer-Laserchirurgie wird in zwei wesentlichen Varianten angewandt:

Kommission Refraktive Chirurgie der DOG und des BVA

1. Vorsitzender: Prof. Dr. T. Kohnen **2. Vorsitzender:** Prof. Dr. E. Fabian **Schriftführer:** Prof. Dr. M.C. Knorz

Geschäftsanschrift:

Berufsverband der Augenärzte Deutschlands (BVA) e.V., Stichwort KRC, Postfach 30 01 55, 40401 Düsseldorf
Fon 0211 - 4303700 FAX 0211 - 4303720
e-mail: krc@augeninfo.de
Internet: <http://www.aad.to/krc/>

1.1. Oberflächenbehandlungen (z.B. Photorefraktive Keratektomie (PRK), trans-PRK und LASEK)

- Beschreibung

Zunächst wird die oberste Schicht der Hornhaut, das Epithel, mechanisch oder mittels Laser entfernt. Anschließend wird mit dem Excimer-Laser das Zentrum der Hornhaut abgetragen, um die Fehlsichtigkeit auszugleichen. Das Epithel bildet sich unter einer Kontaktlinse in wenigen Tagen neu und schließt die oberflächliche Wunde. PRK, LASEK und trans-PRK sind im Wesentlichen gleichzusetzen.

- Anwendungsbereich

Myopiekorrektur bis -6 dpt und Astigmatismuskorrektur bis 5 dpt. Besteht eine Myopie mit Astigmatismus, so ist für die Bewertung die Summe aus Myopie und Astigmatismus zu bilden und nicht das sphärische Äquivalent. Bei gleichzeitig bestehender Presbyopie auch als Monovision.

- Grenzbereich

Myopiekorrektur bis -8 dpt, Astigmatismuskorrektur bis 6 dpt, Hyperopiekorrektur bis $+3$ dpt. Zur Ermittlung der Obergrenzen sind zusätzlich die Grenzwerte für den jeweils höchstbrechenden Hauptschnitt zu beachten (Bsp.: $+3$ sph mit -6 zyl bzw. -3 sph mit $+6$ zyl liegen im Grenzbereich, 0 sph mit $+6$ zyl bzw. $+6$ sph mit -6 zyl liegen außerhalb des Grenzbereichs).

Prophylaktische intraoperative Anwendung von Mitomycin C zur Reduktion postoperativer Narbenbildung: Die wissenschaftliche Datenlage erlaubt keine klare Aussage zur Indikationsstellung. Die KRC sieht derzeit keine wissenschaftliche Grundlage für die primäre Anwendung von Mitomycin C bei nicht voroperierter Hornhaut und empfiehlt sie nicht. Für die intraoperative Anwendung bei voroperierten Hornhäuten erscheint der Einsatz von Mitomycin C vertretbar.

- Nebenwirkungen

In den ersten Tagen nach PRK, LASEK oder trans-PRK ist das Sehvermögen reduziert und es bestehen in der Regel mäßige Beschwerden, in Ausnahmefällen auch stärkere Schmerzen. Grundsätzlich nimmt mit dem Umfang der erforderlichen Korrektur die Komplikationsrate zu. Mögliche Nebenwirkungen umfassen eine oberflächliche Narbenbildung der Hornhaut (Haze), eine teilweise Rückbildung des Operationserfolges innerhalb der ersten Wochen und Monate und eine Verschlechterung des Sehvermögens

Kommission Refraktive Chirurgie der DOG und des BVA

1. Vorsitzender: Prof. Dr. T. Kohnen **2. Vorsitzender:** Prof. Dr. E. Fabian **Schriftführer:** Prof. Dr. M.C. Knorz

Geschäftsanschrift:

Berufsverband der Augenärzte Deutschlands (BVA) e.V., Stichwort KRC, Postfach 30 01 55, 40401 Düsseldorf
Fon 0211 - 4303700 FAX 0211 - 4303720
e-mail: krc@augeninfo.de
Internet: <http://www.aad.to/krc/>

bei Dämmerung und Nacht mit Wahrnehmung von Halos und Schattenbildern, insbesondere bei Patienten mit weiter Pupille. Des Weiteren kommt es häufig vorübergehend zu einer vermehrten Trockenheit der Augen. Weitere extrem seltene Nebenwirkungen sind eine Infektion und eine starke Narbenbildung mit erheblicher Herabsetzung des Sehvermögens.

- Kontraindikationen

Chronisch progressive Hornhauterkrankungen, Behandlungen unter dem 18. Lebensjahr, symptomatische Katarakt, Glaukom mit ausgeprägten Gesichtsfeldschäden, da die Steroidgabe den Druck erhöhen kann, und exsudative Makuladegeneration.

1. 2. Laser in situ Keratomileusis (LASIK) und Femto-LASIK

- Beschreibung

Bei der LASIK wird zunächst mit einem Mikrokeratom („Hobel“) eine ca. 0,1 - 0,15 mm dicke Lamelle der Hornhaut teilweise abgetrennt und wie ein Deckel umgeklappt. Bei der moderneren Form der LASIK, Femto-LASIK oder auch Laser-LASIK, ersetzt der Femtosekundenlaser das Mikrokeratom. Anschließend wird mittels des Excimer-Lasers das Innere der Hornhaut abgetragen, um die Fehlsichtigkeit auszugleichen. Danach wird die Hornhautlamelle wieder zurückgeklappt. Sie adaptiert sich von selbst.

- Anwendungsbereich

Myopiekorrektur bis -8 dpt, Astigmatismuskorrektur bis 5 dpt und Hyperopiekorrektur bis $+3$ dpt. Bei gleichzeitig bestehender Presbyopie auch als Monovision. Zur Ermittlung der Obergrenzen sind zusätzlich die Grenzwerte für den jeweils höchstbrechenden Hauptschnitt zu beachten (Bsp.: $+3$ sph mit -5 zyl bzw. -3 sph mit $+5$ zyl liegen im Anwendungsbereich, 0 sph mit $+5$ zyl bzw. $+5$ sph mit -5 zyl liegen außerhalb des Anwendungsbereichs).

- Grenzbereich

Myopiekorrektur bis -10 dpt, Astigmatismuskorrektur bis 6 dpt, Hyperopiekorrektur bis $+4$ dpt. Zur Ermittlung der Obergrenzen sind zusätzlich die Grenzwerte für den jeweils höchstbrechenden Hauptschnitt zu beachten (Bsp.: $+4$ sph mit -6 zyl bzw. -4 sph mit $+6$ zyl liegen im Grenzbereich, 0 sph mit $+6$ zyl bzw. $+6$ sph mit -6 zyl liegen außerhalb des Grenzbereichs).

Kommission Refraktive Chirurgie der DOG und des BVA

1. Vorsitzender: Prof. Dr. T. Kohnen **2. Vorsitzender:** Prof. Dr. E. Fabian **Schriftführer:** Prof. Dr. M.C. Knorz

Geschäftsanschrift:

Berufsverband der Augenärzte Deutschlands (BVA) e.V., Stichwort KRC, Postfach 30 01 55, 40401 Düsseldorf
Fon 0211 - 4303700 FAX 0211 - 4303720
e-mail: krc@augeninfo.de
Internet: <http://www.aad.to/krc/>

- Nebenwirkungen

In den ersten Stunden nach LASIK bzw. Femto-LASIK ist das Sehvermögen reduziert und es bestehen mäßige Beschwerden. Grundsätzlich nimmt mit dem Umfang der erforderlichen Korrektur die Komplikationsrate zu. Mögliche Nebenwirkungen umfassen eine teilweise Rückbildung des Operationserfolges innerhalb der ersten Wochen und eine Verschlechterung des Sehvermögens bei Dämmerung und Nacht mit Wahrnehmung von Halos und Schattenbildern, insbesondere bei Patienten mit weiter Pupille. Des Weiteren kommt es häufig vorübergehend zu einer vermehrten Trockenheit der Augen. Beim Schneiden der Hornhautlamelle kann es in seltenen Fällen zu umschriebenen Epithelablösungen und Schnittfehlern kommen. Zarte Fältelungen der vorderen Hornhautlamelle stellen sehr seltene Nebenwirkungen der frühen Wundheilung dar. Sehr seltene Nebenwirkungen sind sterile Entzündungsreaktionen im Rahmen der Wundheilung, eine Infektion mit starker Narbenbildung sowie eine Schwächung und Vorwölbung der Hornhaut (Keratektasie) mit deutlicher Herabsetzung des Sehvermögens.

- Kontraindikationen

Präoperative Hornhautdicke unter 480 µm (bei Anwendung eines Femtosekundenlasers) bzw. unter 500 µm (bei Anwendung eines mechanischen Mikrokeratomes), Dicke des Hornhautstromas unter dem Flap nach Ablation unter 250µm auch nach Nachoperation, chronisch progressive Hornhauterkrankungen und forme fruste Keratokonus, Behandlungen unter dem 18. Lebensjahr, symptomatische Katarakt, Glaukom mit ausgeprägten Gesichtsfeldschäden und exsudative Makuladegeneration.

2. Refraktive Lentikelextraktion (RELEX) mittels Femtosekundenlaser (auch „FLEX, Femtosekundenlaser Lentikelextraktion“ bzw. Small Incision Lenticule Extraction („SMILE“)

- Beschreibung

Bei der RELEX FLEX und der RELEX SMILE wird nur ein Femtosekundenlaser eingesetzt. Bei der RELEX FLEX führt dieser einen Doppelschnitt in der Hornhaut durch und erzeugt damit ein Gewebescheibchen, das nach dem Anheben der vorderen Hornhautlamelle entfernt wird. Danach wird die Hornhautlamelle wieder zurückgeklappt. Sie saugt sich von selbst fest und muss nicht angenäht werden. Bei der RELEX SMILE wird das Gewebescheibchen ohne Anhebung der vorderen Lamelle (Cap) über eine oder zwei kleine seitliche Öffnungen extrahiert.

Kommission Refraktive Chirurgie der DOG und des BVA

1. Vorsitzender: Prof. Dr. T. Kohnen **2. Vorsitzender:** Prof. Dr. E. Fabian **Schriftführer:** Prof. Dr. M.C. Knorz

Geschäftsanschrift:

Berufsverband der Augenärzte Deutschlands (BVA) e.V., Stichwort KRC, Postfach 30 01 55, 40401 Düsseldorf
Fon 0211 - 4303700 FAX 0211 - 4303720
e-mail: krc@augeninfo.de
Internet: <http://www.aad.to/krc/>

- Anwendungsbereich

Myopiekorrektur von -1 bis -8 dpt und Astigmatismuskorrektur bis -5 dpt. Bei gleichzeitig bestehender Presbyopie auch als Monovision. Zur Ermittlung der Obergrenzen sind zusätzlich die Grenzwerte für den jeweils höchstbrechenden Hauptschnitt zu beachten.

- Grenzbereich

Myopiekorrektur von -8 bis -10 dpt

- Nebenwirkungen

Eine Nachoperation ist mit dem gleichen Verfahren nicht möglich, worüber gezielt aufzuklären ist. In den ersten Tagen nach RELEX/SMILE ist das Sehvermögen häufig reduziert und es bestehen mäßige Beschwerden. Mit dem Umfang der erforderlichen Korrektur kann die Komplikationsrate zunehmen. Mögliche Nebenwirkungen umfassen eine teilweise Rückbildung des Operationserfolges innerhalb der ersten Wochen und eine Verschlechterung des Sehvermögens bei Dämmerung und Nacht mit Wahrnehmung von Halos und Schattenbildern, insbesondere bei Patienten mit weiter Pupille. Des Weiteren kommt es häufig vorübergehend zu einer vermehrten Trockenheit der Augen. Beim Schneiden der Hornhautlamelle kann es in seltenen Fällen zu umschriebenen Epithelablösungen und Schnittfehlern kommen. In einigen Fällen entstehen unregelmäßige Schnittflächen, was zu Irregularitäten der Hornhautoberfläche mit Herabsetzung des Sehvermögens führen kann. Ebenso kann in einigen Fällen das Gewebescheibchen nicht vollständig entfernt werden, was ebenfalls zu Irregularitäten der Hornhautoberfläche mit Herabsetzung des Sehvermögens führen kann. Sehr seltene Nebenwirkungen sind sterile Entzündungsreaktionen im Rahmen der Wundheilung, eine Infektion mit starker Narbenbildung sowie eine Schwächung und Vorwölbung der Hornhaut (Keratektasie) mit deutlicher Herabsetzung des Sehvermögens.

- Kontraindikationen

Präoperative Hornhautdicke unter 480 µm, Dicke des Hornhautstromas unter dem Flap bzw. Cap nach Entfernung des Gewebescheibchens unter 250 µm auch nach Nachoperation, chronisch progressive Hornhauterkrankungen und forme fruste Keratokonus, Behandlungen unter dem 18. Lebensjahr, symptomatische Katarakt, Glaukom mit ausgeprägten Gesichtsfeldschäden und exsudative Makuladegeneration.

Kommission Refraktive Chirurgie der DOG und des BVA

1. Vorsitzender: Prof. Dr. T. Kohnen **2. Vorsitzender:** Prof. Dr. E. Fabian **Schriftführer:** Prof. Dr. M.C. Knorz

Geschäftsanschrift:

Berufsverband der Augenärzte Deutschlands (BVA) e.V., Stichwort KRC, Postfach 30 01 55, 40401 Düsseldorf
Fon 0211 - 4303700 FAX 0211 - 4303720
e-mail: krc@augeninfo.de
Internet: <http://www.aad.to/krc/>

3. Astigmatische Keratotomie (AK), Laser-Keratotomie (Laser-AK) und Limbale Relaxierende Inzisionen (LRI)

- Beschreibung

Bei der AK bzw. Laser-AK bzw. LRI werden in der Hornhaut mit einem Diamantmesser bzw. einem Excimer-Laser ein oder zwei bogenförmige tiefe Schnitte angebracht. Alternativ können diese Schnitte auch mit einem Femtosekundenlaser durchgeführt werden. Durch diese Schnitte wird die Hornhaut in der Achse des Astigmatismus entspannt, es kommt zu einer Reduzierung der Astigmatismus

- Anwendungsbereich

Reduzierung des Astigmatismus besonders bei Kataraktoperation oder nach Keratoplastik.

- Nebenwirkungen

In einigen Fällen kommt es zu einem irregulären Astigmatismus oder zu einer deutlichen Unter- oder Überkorrektur, gerade nach Keratoplastik. Zudem ist eine Epitheleinwachsung in die Schnitte möglich. In extrem seltenen Fällen ist eine Perforation des Auges möglich.

- Kontraindikationen

Chronisch progressive Hornhauterkrankungen und Behandlungen unter dem 18. Lebensjahr.

4. Intracorneale Ringsegmente

- Beschreibung

Zur Implantation der Ringsegmente werden in die äußere Hornhaut mechanisch oder mittels eines Femtosekundenlasers schmale Tunnel geschnitten, in die halbbogenförmige Ringspannen aus Acrylglas (PMMA) eingesetzt werden.

- Anwendungsbereich

Verbesserung der Brechungseigenschaft der Hornhaut und ihre Stabilisierung zur Verbesserung der Sehschärfe bei Keratokonus oder Keratektasie und nach dezentrierten Laserablationen, falls Kontaktlinsen keine ausreichende Korrektur mehr ermöglichen.

Kommission Refraktive Chirurgie der DOG und des BVA

1. Vorsitzender: Prof. Dr. T. Kohnen **2. Vorsitzender:** Prof. Dr. E. Fabian **Schriftführer:** Prof. Dr. M.C. Knorz

Geschäftsanschrift:

Berufsverband der Augenärzte Deutschlands (BVA) e.V., Stichwort KRC, Postfach 30 01 55, 40401 Düsseldorf
Fon 0211 - 4303700 FAX 0211 - 4303720
e-mail: krc@augeninfo.de
Internet: <http://www.aad.to/krc/>

- Grenzbereich

Entfällt.

- Nebenwirkungen

Häufig sind optisch störende Nebeneffekte wie die Wahrnehmung von Halos und vermehrte Blendempfindlichkeit sowie eine Rückbildung des Korrektoreffektes. Selten kann es zu Infektion, zu Narbenbildung oder Hornhauteinschmelzung mit Verlagerung der Ringsegmente kommen.

- Kontraindikationen

Hornhautdicke im Bereich des Ringsegmentes unter 300 µm.

5. Hornhautvernetzung

- Beschreibung

Nach mechanischer Entfernung des Hornhautepithels wird Riboflavin auf die Hornhaut getropft und die Hornhaut mit UV-A Licht für ca. 10 bis 30 min (je nach Strahlungsintensität) bestrahlt. Hierdurch soll die Hornhaut versteift werden, um chronisch progrediente Hornhauterkrankungen zu stoppen. Möglicherweise kann durch eine höhere Bestrahlungsenergie auch eine kürzere Bestrahlung der Hornhaut ausreichen.

- Anwendungsbereich

Operative Korrektur des Keratokonus bzw. der PMD zur Hornhautstabilisierung und Astigmatismusreduktion sowie Behandlung der Keratektasie nach LASIK.

- Grenzbereich

Simultane PRK und Hornhautvernetzung zur refraktiven Korrektur des Keratokonus oder zur Behandlung der Keratektasie nach LASIK.

- Nebenwirkungen

Selten sind sterile Entzündungen sowie Infektionen mit Narbenbildung. Des Weiteren ist bei zu geringer Hornhautdicke eine Schädigung des Endothels mit Eintrübung der Hornhaut möglich. Eine vermehrte Licht- bzw. Blendempfindlichkeit kann über einige Wochen, selten auch länger, auftreten. Patienten sind wegen der vorübergehenden

Kommission Refraktive Chirurgie der DOG und des BVA

1. Vorsitzender: Prof. Dr. T. Kohnen **2. Vorsitzender:** Prof. Dr. E. Fabian **Schriftführer:** Prof. Dr. M.C. Knorz

Geschäftsanschrift:

Berufsverband der Augenärzte Deutschlands (BVA) e.V., Stichwort KRC, Postfach 30 01 55, 40401 Düsseldorf
Fon 0211 - 4303700 FAX 0211 - 4303720
e-mail: krc@augeninfo.de
Internet: <http://www.aad.to/krc/>

Hornhauttrübung häufig 1-2 Wochen arbeitsunfähig. Zudem ist auch nach Jahren eine Änderung der Refraktion, insbesondere des Astigmatismus, möglich.

- Kontraindikationen

Hornhautdicke ohne Epithel auch nach Hydratation unter 400 µm, um die Gefahr einer Endothelzellschädigung zu minimieren.

Neben der therapeutischen Anwendung der Hornhautvernetzung wird diese auch in einer stark verkürzten Form in Kombination mit einer LASIK zur Korrektur einer Fehlsichtigkeit beworben. Die Wirksamkeit dieser Behandlungsform ist bisher nicht durch wissenschaftliche Untersuchungen belegt. Es fehlen zudem ausreichende Daten über eine mögliche Schädigung der Hornhaut im Vergleich zur LASIK ohne Hornhautvernetzung, so dass die Anwendung dieses Verfahrens derzeit außerhalb wissenschaftlicher Studien mit Genehmigung der Ethikkommission nach Ansicht der KRC nicht gerechtfertigt ist.

6. Implantation intraokularer Linsen in phake Augen (Phake IOL)

- Beschreibung

Beim Einsatz phaker IOL wird das Auge am Rand der Hornhaut eröffnet und es wird eine zusätzliche Linse (=phake IOL) in das Auge eingesetzt, vergleichbar einer Kontaktlinse. Diese Zusatzlinse wird entweder an der Iris befestigt oder im Randbereich der Augenvorderkammer (Kammerwinkel) abgestützt. Andere Modelle sitzen hinter der Iris, auf der Augenlinse. Nach dem Einsetzen der IOL dichtet sich der Schnitt entweder selbst ab oder wird mittels einer Naht verschlossen.

- Anwendungsbereich

Myopie ab -3 dpt und Hyperopie ab +3 dpt, sowie Astigmatismus. Bei Restfehlsichtigkeit nach Implantation der phaken IOL kann zusätzlich ein Laserverfahren gemäß 1.1 bzw. 1.2 angewandt werden.

- Grenzbereich

Myopie ab -1 dpt und Hyperopie ab +1 dpt.

Kommission Refraktive Chirurgie der DOG und des BVA

1. Vorsitzender: Prof. Dr. T. Kohnen **2. Vorsitzender:** Prof. Dr. E. Fabian **Schriftführer:** Prof. Dr. M.C. Knorz

Geschäftsanschrift:

Berufsverband der Augenärzte Deutschlands (BVA) e.V., Stichwort KRC, Postfach 30 01 55, 40401 Düsseldorf
Fon 0211 - 4303700 FAX 0211 - 4303720
e-mail: krc@augeninfo.de
Internet: <http://www.aad.to/krc/>

- Nebenwirkungen

In seltenen Fällen beschrieben sind eine anfallsartige Erhöhung des Augeninnendruckes (Glaukomanfall), Auftreten einer Irisschädigung im Sinne eines Urrets-Zavalía Syndroms, eine Verziehung der Pupille (Corectopie), eine Schädigung der Hornhautrückfläche (Endothel) mit Hornhauteintrübung, eine Trübung der Augenlinse (Katarakt), eine Verschiebung oder Lockerung der Kunstlinse, sowie eine chronische Entzündung des Auges. Beschrieben sind zudem u.a. das Auftreten einer Netzhautablösung vor allem nach Myopiekorrektur sowie bakterielle Infektionen. Da bei der Operation das Auge eröffnet wird, kann in extrem seltenen Fällen durch eine Infektion eine Erblindung auftreten.

- Kontraindikationen

Behandlungen unter dem 18. Lebensjahr, Glaukom mit ausgeprägten Gesichtsfeldschäden, vorbestehende Hornhautschäden mit stark reduzierten Endothelzellzahlen und Endothelzelldichte unter 2.000/mm², unzureichende Vorderkammertiefe (unter 2,8 mm bei Myopie bzw. 3,0 mm bei Hyperopie, gemessen vom Endothel; wenn vom Epithel gemessen wird, muss die Hornhautdicke gemessen und vom Messwert abgezogen werden).

- Sonstiges

Bei allen phaken IOL sind Nachuntersuchungen der Hornhautendothelzelldichte mindestens jährlich erforderlich. Diese sind nach aktuellem Stand nicht zulasten der GKV abrechnungsfähig. Die KRC rät von der beidseitigen Implantation phaker IOLs an einem Operationstag ab.

7. Austausch der Augenlinse gegen eine Kunstlinse zum Ausgleich einer Fehlsichtigkeit („refraktiver Linsenaustausch (RLA)“ bzw. „refractive lens exchange (RLE““))

a. monofokale IOL (asphärisch und / oder torisch)

- Beschreibung

Beim RLA wird das Auge am Rand der Hornhaut eröffnet und es wird wie bei der modernen Kataraktchirurgie die Augenlinse entfernt und durch eine Kunstlinse ersetzt. Die Kunstlinse verfügt entweder über einen Brennpunkt (monofokale IOL) oder aber über zwei und mehr Brennpunkte (multifokale IOL). Zudem kann sie asphärisch sein und ggf. auch einen Zylinder korrigieren (torische IOL bzw. torische multifokale IOL).

Kommission Refraktive Chirurgie der DOG und des BVA

1. Vorsitzender: Prof. Dr. T. Kohnen **2. Vorsitzender:** Prof. Dr. E. Fabian **Schriftführer:** Prof. Dr. M.C. Knorz

Geschäftsanschrift:

Berufsverband der Augenärzte Deutschlands (BVA) e.V., Stichwort KRC, Postfach 30 01 55, 40401 Düsseldorf
Fon 0211 - 4303700 FAX 0211 - 4303720
e-mail: krc@augeninfo.de
Internet: <http://www.aad.to/krc/>

- Anwendungsbereich

Myopie und Hyperopie bei gleichzeitig bestehender Presbyopie sowie Presbyopie. Bei gleichzeitig bestehendem Astigmatismus kann sowohl eine torische IOL als auch ein Laserverfahren gemäß 1.1 bzw. 1.2 oder eine AK gemäß 3. angewandt werden.

- Grenzbereich

Hohe Myopie (> -6 dpt) und hohe Hyperopie ($> +4$ dpt) ohne Presbyopie.

- Nebenwirkungen

Mit monofokalen IOL wird eine Lesebrille erforderlich. Nach RLA kann es nach Monaten bis Jahren zu einer sekundären Trübung hinter der neuen Kunstlinse (Nachstar) kommen, die mittels eines Lasers ohne erneute Eröffnung des Auges einfach behandelt werden kann. Da bei der Operation das Auge eröffnet wird, kann in extrem seltenen Fällen durch eine Infektion eine Erblindung auftreten. Bei vorbestehender Myopie wird das Risiko einer Netzhautablösung erhöht, besonders bei Anwendung unterhalb des 50. Lebensjahres bzw. bei unvollständiger Glaskörperabhebung.

- Kontraindikationen

Behandlungen unter dem 18. Lebensjahr.

Die KRC rät von der beidseitigen Durchführung eines operativen Linsenaustausches an einem Tag ab.

b. mehrfokale (bifokale/trifokale/quadrifokale) IOL bzw. extendend depth of focus (EDOF) IOL (asphärisch und / oder torisch)

- Beschreibung

Beim RLA wird das Auge am Rand der Hornhaut eröffnet und es wird wie bei der modernen Kataraktchirurgie die Augenlinse entfernt und durch eine Kunstlinse ersetzt. Die Kunstlinse verfügt entweder über einen Brennpunkt (monofokale IOL) oder aber über zwei und mehr Brennpunkte (multifokale IOL). Zudem kann sie asphärisch sein und ggf. auch einen Zylinder korrigieren (torische IOL bzw. torische multifokale IOL).

Kommission Refraktive Chirurgie der DOG und des BVA

1. Vorsitzender: Prof. Dr. T. Kohnen **2. Vorsitzender:** Prof. Dr. E. Fabian **Schriftführer:** Prof. Dr. M.C. Knorz

Geschäftsanschrift:

Berufsverband der Augenärzte Deutschlands (BVA) e.V., Stichwort KRC, Postfach 30 01 55, 40401 Düsseldorf
Fon 0211 - 4303700 FAX 0211 - 4303720
e-mail: krc@augeninfo.de
Internet: <http://www.aad.to/krc/>

- Anwendungsbereich

Hyperopie sowie hohe Myopie (> - 6 dpt) bei gleichzeitig bestehender Presbyopie. Bei gleichzeitig bestehendem Astigmatismus kann sowohl eine torische IOL als auch ein Laserverfahren gemäß 1.1 bzw. 1.2 oder eine AK gemäß 3. angewandt werden.

- Grenzbereich

Myopie und Hyperopie ohne Presbyopie sowie Presbyopie bei Emmetropie.

- Nebenwirkungen

Mit mehrfokalen IOL sind i.d.R. weder Fern- noch Lesebrille erforderlich, es kann jedoch zu einer Verschlechterung des Dämmerungssehvermögens mit Wahrnehmung von Halos und Blendempfindlichkeit kommen. Nach RLA kann es nach Monaten bis Jahren zu einer sekundären Trübung hinter der neuen Kunstlinse (Nachstar) kommen, die mittels eines Lasers ohne erneute Eröffnung des Auges einfach behandelt werden kann. Da bei der Operation das Auge eröffnet wird, kann in extrem seltenen Fällen durch eine Infektion eine Erblindung auftreten. Bei vorbestehender Myopie wird das Risiko einer Netzhautablösung erhöht, besonders bei Anwendung unterhalb des 50. Lebensjahres bzw. bei unvollständiger Glaskörperabhebung.

- Kontraindikationen

Behandlungen unter dem 18. Lebensjahr.

Die KRC rät von der beidseitigen Durchführung eines operativen Linsenaustausches an einem Tag ab.

8. Einpflanzung von Hornhautimplantaten zur Korrektur der Fehlsichtigkeit (meist der Presbyopie)

Mit Hornhautimplantaten kann die Form der Hornhaut verändert werden oder es kann eine künstliche Pupille geschaffen werden, jeweils mit dem Ziel, eine Fehlsichtigkeit, zumeist die Presbyopie (Alterssichtigkeit), zu korrigieren.

Kommission Refraktive Chirurgie der DOG und des BVA

1. Vorsitzender: Prof. Dr. T. Kohnen **2. Vorsitzender:** Prof. Dr. E. Fabian **Schriftführer:** Prof. Dr. M.C. Knorz

Geschäftsanschrift:

Berufsverband der Augenärzte Deutschlands (BVA) e.V., Stichwort KRC, Postfach 30 01 55, 40401 Düsseldorf
Fon 0211 - 4303700 FAX 0211 - 4303720

e-mail: krc@augeninfo.de

Internet: <http://www.aad.to/krc/>

- Beschreibung

Das Implantat wird in eine Hornhauttasche eingesetzt und zwar nur am nichtdominanten Auge. Es bewirkt eine Zunahme der Schärfentiefe und damit ein besseres Sehen im mittleren und im Nahbereich. Ein vollständiger Verzicht auf eine Lesebrille ist zumeist nicht möglich.

- Anwendungsbereich

Für die Festlegung des Anwendungsbereiches fehlen derzeit noch ausreichende Daten.

- Grenzbereich

Presbyopiekorrektur bei Emmetropie oder in Kombination mit LASIK, bei Anwendung in einer mit einem Femtosekundenlaser präparierten Hornhauttasche in einer Tiefe von mindestens 200 µm, nur im nichtdominanten Auge.

- Nebenwirkungen

Aufgrund der bei manchen Implantaten dunklen Einfärbung ist das Implantat in diesen Fällen sichtbar und führt bei heller Iris u.U. zu einer kosmetischen Beeinträchtigung. Mögliche Nebenwirkungen umfassen eine Narbenbildung der Hornhaut im Bereich des Implantates und eine Verschlechterung des Sehvermögens bei Dämmerung und Nacht mit Wahrnehmung von Halos und Schattenbildern, insbesondere bei Patienten mit weiter Pupille. Des Weiteren kommt es häufig vorübergehend zu einer vermehrten Trockenheit der Augen. Weitere extrem seltene Nebenwirkungen sind eine Infektion und eine starke Narbenbildung mit ggf. hyperoper Refraktionsverschiebung sowie eine Einschmelzung der Hornhaut mit erheblicher Herabsetzung des Sehvermögens.

- Kontraindikationen

Chronisch progressive Hornhauterkrankungen, Behandlungen unter dem 18. Lebensjahr, symptomatische Katarakt, Glaukom mit ausgeprägten Gesichtsfeldschäden und exsudative Makuladegeneration.

Kommission Refraktive Chirurgie der DOG und des BVA

1. Vorsitzender: Prof. Dr. T. Kohnen **2. Vorsitzender:** Prof. Dr. E. Fabian **Schriftführer:** Prof. Dr. M.C. Knorz

Geschäftsanschrift:

Berufsverband der Augenärzte Deutschlands (BVA) e.V., Stichwort KRC, Postfach 30 01 55, 40401 Düsseldorf
Fon 0211 - 4303700 FAX 0211 - 4303720
e-mail: krc@augeninfo.de
Internet: <http://www.aad.to/krc/>

Behandlungshonorare

Die refraktiv-chirurgische Versorgung und eventuell zusätzliche, damit in Zusammenhang stehende vorangehende und nachfolgende ärztliche Leistungen sind grundsätzlich keine Kassenleistung. Das Ausstellen einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ist nicht möglich, da es sich nach derzeitiger Rechtsauffassung bei komplikationslosem Verlauf um eine selbstverschuldete Arbeitsunfähigkeit handelt und somit kein Anspruch auf Lohnfortzahlung besteht.

Die refraktive Chirurgie ist von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung in den Katalog der individuell zu finanzierenden Gesundheitsleistungen (IGEL) aufgenommen worden. Sie zählt zudem gemäß der „Richtlinien über die Bewertung ärztlicher Untersuchungs- und Behandlungsmethoden gemäß § 135 Abs. 1 SGB V (BUB Richtlinien)“ des Bundesausschusses der Ärzte und Krankenkassen vom 10.12.1999 nach Anlage B zu den „**Methoden, die nicht als vertragsärztliche Leistungen zulasten der Krankenkassen erbracht werden dürfen**“ (publiziert im Deutschen Ärzteblatt 2000; 97:A-864 - A-868).

Die ausführliche Beratung vor einem refraktiven Eingriff mit eventuell zusätzlich notwendigen Untersuchungen sowie ggf. die Weiterleitung an einen entsprechenden Operateur sind von dem die Leistung erbringenden Augenarzt direkt nach GOÄ in Rechnung zu stellen. Für die Honorierung der Operation selbst sind ebenfalls die Bestimmungen der GOÄ unter Hinzuziehung von Analogziffern anzuwenden. Die Bundesärztekammer hat hierzu Empfehlungen herausgegeben (z.B. für die PRK bzw. PTK die Ziffer A 5855, für die LASIK die Ziffer 1345 in Kombination mit der Analogziffer A 5855).

Da es sich bei refraktiv-chirurgischen Eingriffen nicht um kosmetische Operationen handelt, kann die Behandlung eventueller postoperativer Komplikationen zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung abgerechnet werden. Bei komplikationslosem Verlauf ist davon auszugehen, dass nach 3 Monaten die Behandlung im Rahmen des refraktiv-chirurgischen Eingriffs abgeschlossen ist, so dass nach gegenwärtiger Rechtsauffassung dann eine kassenärztliche Weiterbehandlung erfolgen kann. Ausgenommen hiervon sind erneute refraktiv-chirurgische Operationen.

Die nach Implantation phaker IOL jährlich erforderliche Untersuchung des Hornhautendothels kann nicht zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung abgerechnet werden, sondern ist vom Untersucher nach GOÄ zu liquidieren (siehe Analogziffern des BVA). Gleiches gilt für die Kontrolle des intraokularen Druckes.

Kommission Refraktive Chirurgie der DOG und des BVA

1. Vorsitzender: Prof. Dr. T. Kohnen **2. Vorsitzender:** Prof. Dr. E. Fabian **Schriftführer:** Prof. Dr. M.C. Knorz

Geschäftsanschrift:

Berufsverband der Augenärzte Deutschlands (BVA) e.V., Stichwort KRC, Postfach 30 01 55, 40401 Düsseldorf
Fon 0211 - 4303700 FAX 0211 - 4303720
e-mail: krc@augeninfo.de
Internet: <http://www.aad.to/krc/>

Qualitätssicherungsempfehlungen

Refraktive Hornhautchirurgie (PRK, LASEK, Trans-PRK, LASIK, Femto-LASIK, RELEX FLEX/SMILE, AK, LRI, intracorneale Implantate, Hornhautvernetzung)

1. Strukturqualität

1.1. Persönliche Qualifikation

Die Verfahren der refraktiven Hornhautchirurgie sind augenärztliche invasive operative Eingriffe, die einer besonderen Sachkenntnis bedürfen. Bei der Durchführung sind die allgemeinen Richtlinien der Bundesärztekammer zur Qualitätssicherung ambulanter Operationen einzuhalten. Ferner sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen:

- Teilnahme an einem von der KRC anerkannten und in Zusammenarbeit mit der KRC durchgeführten theoretischen Kurs (Grundkurs und Aufbaukurs)
- Hospitation bei einem von der KRC anerkannten Trainer
- Durchführung der ersten operativen Eingriffe in Anwesenheit eines von der KRC anerkannten Trainers

Die Ausbildung gemäß 1.1. wird durch eine Bescheinigung der KRC bestätigt. Die Ausbildungsempfehlungen gemäß 1.1. gelten für alle Anwender, die namentlich auf die Anwenderliste aufgenommen werden wollen. Voraussetzung ist, dass der Antragsteller über die Anerkennung als Facharzt für Augenheilkunde verfügt.

1.2. Apparative Voraussetzung

- Gemäß § 6 der „Unfallverhütungsvorschrift Laserstrahlung“ ist die Benennung eines Laserschutzbeauftragten erforderlich (falls Laser eingesetzt werden).
- Vor jeder Operation müssen sich die Anwender davon überzeugen, dass der Excimer-Laser und das verwendete Keratom bzw. der verwendete Femtosekundenlaser über die zum Einsatz erforderlichen Funktionen verfügen (falls Laser bzw. Keratome eingesetzt werden).

1.3. Räumliche Voraussetzungen

- Der Behandlungsraum muss der „Unfallverhütungsvorschrift Laserstrahlung“ entsprechen (falls Laser eingesetzt werden).

Kommission Refraktive Chirurgie der DOG und des BVA

1. **Vorsitzender:** Prof. Dr. T. Kohnen 2. **Vorsitzender:** Prof. Dr. E. Fabian **Schriftführer:** Prof. Dr. M.C. Knorz

Geschäftsanschrift:

Berufsverband der Augenärzte Deutschlands (BVA) e.V., Stichwort KRC, Postfach 30 01 55, 40401 Düsseldorf
Fon 0211 - 4303700 FAX 0211 - 4303720
e-mail: krc@augeninfo.de
Internet: <http://www.aad.to/krc/>

- Die Mindestanforderungen an die bauliche, apparativ-technische und hygienische Ausstattung gemäß Anlage 1 der "Richtlinien der Bundesärztekammer zur Qualitätssicherung ambulanter Operationen" vom 13.4.1994 müssen erfüllt sein.

2. Prozessqualität

2.1. Patientenaufklärung

Jeder Anwender ist zu einer ausführlichen präoperativen Aufklärung des Patienten über den geplanten Eingriff verpflichtet. Die Indikationsstellung muss durch einen auf der KRC – Liste aufgenommenen Facharzt für Augenheilkunde erfolgen. Die Aufklärung muss ein Arzt vornehmen. Da es sich um hoch elektive Eingriffe handelt, müssen regelhaft sowohl die Indikationsstellung als auch die Aufklärung bereits vor dem OP-Tag erfolgen, um eine ausreichende Bedenkzeit zu gewährleisten. Am OP-Tag selber sollte nur die Methode durchgeführt werden, für die auch aufgeklärt und unterschrieben wurde. Ein intraoperativer begründeter Methodenwechsel im Einzelfall bedarf einer entsprechenden präoperativen Aufklärung.

2.2. Präoperative Diagnostik

Die präoperative Diagnostik muss durch einen auf der KRC – Liste aufgenommenen Facharzt für Augenheilkunde erfolgen. Präoperativ sind mindestens folgende Untersuchungen erforderlich und zu dokumentieren:

- Untersuchung der Hornhauttopographie mittels computergestützter Videokeratoskopie
- Prüfung der unkorrigierten und korrigierten Sehschärfe, ggf. nach Ausschaltung der Akkommodation (bei Hyperopie ist unterhalb des 45. Lebensjahres die Bestimmung der subjektiven Refraktion nach Ausschaltung der Akkommodation zwingend erforderlich)
- Messung des Augeninnendruckes
- Messung des mesopischen Pupillendurchmessers (0,05 - 50 Lux)
- Messung der Aniseikonie bei Anisometropie sowie Bestimmung der Verträglichkeit der geplanten Korrektur durch Kontaktlinsen-Trageversuch.
- Untersuchung der vorderen und hinteren Augenabschnitte in medikamentöser Mydriasis

Kommission Refraktive Chirurgie der DOG und des BVA

1. Vorsitzender: Prof. Dr. T. Kohnen **2. Vorsitzender:** Prof. Dr. E. Fabian **Schriftführer:** Prof. Dr. M.C. Knorz

Geschäftsanschrift:

Berufsverband der Augenärzte Deutschlands (BVA) e.V., Stichwort KRC, Postfach 30 01 55, 40401 Düsseldorf
Fon 0211 - 4303700 FAX 0211 - 4303720
e-mail: krc@augeninfo.de
Internet: <http://www.aad.to/krc/>

- Messung der Hornhautdicke (Hornhauttomographie) mittels optischer Verfahren über einen zentralen Bereich von mindestens 6 mm.
- Ausschluss medizinischer Kontraindikationen

2.3. Postoperative Diagnostik (siehe auch 3.1.)

Postoperativ sind regelmäßige augenärztliche Kontrolluntersuchungen erforderlich und zu dokumentieren. Diese müssen mindestens umfassen:

- Untersuchung der Hornhauttopographie mittels computergestützter Videokeratoskopie (mindestens einmal innerhalb der ersten 12 postoperativen Monate)
- Prüfung der unkorrigierten und korrigierten Sehschärfe
- Messung des Augeninnendruckes
- Untersuchung der vorderen und hinteren Augenabschnitte

Sind der Operateur und der nachbehandelnde Arzt nicht identisch, muss eine Kooperation für die Nachbehandlung gewährleistet sein.

2.4. Operativer Eingriff

Grundsätzlich sind folgende Mindestvoraussetzungen zu berücksichtigen:

- Lokalanästhesie (Tropfanästhesie)
- Keratotomie bzw. Epithelentfernung unter aseptischen Bedingungen mit sterilen Instrumenten (Ausnahme: rein intrastromale AK mit dem Femtosekundenlaser)
- Durchmesser der Zone voller Korrektur nicht unter 6 mm
- eine Hornhautrestdicke von 250 µm für das stromale Bett darf auch nach Nachbehandlung nicht unterschritten werden
- Nachbehandlung mit Antibiotika – und steroidhaltigen Augentropfen (Ausnahme: rein intrastromale AK mit dem Femtosekundenlaser)

Kommission Refraktive Chirurgie der DOG und des BVA

1. Vorsitzender: Prof. Dr. T. Kohnen **2. Vorsitzender:** Prof. Dr. E. Fabian **Schriftführer:** Prof. Dr. M.C. Knorz

Geschäftsanschrift:

Berufsverband der Augenärzte Deutschlands (BVA) e.V., Stichwort KRC, Postfach 30 01 55, 40401 Düsseldorf
Fon 0211 - 4303700 FAX 0211 - 4303720
e-mail: krc@augeninfo.de
Internet: <http://www.aad.to/krc/>

3. Ergebnisqualität

3.1. Dokumentation

Zur Dokumentation des Behandlungsergebnisses sind mindestens die Befunde und Operationsdaten gemäß der unter 2.2. und 2.3. Untersuchungen festzuhalten.

3.2. Fortbildung

Eine regelmäßige Fortbildung ist erforderlich. Hierzu geeignet ist u.a. der Nachweis der Teilnahme an einem Aufbaukurs bzw. Fortgeschrittenenkurs der KRC pro Kalenderjahr.

4. Anwenderlisten

Alle Anwender, die die Voraussetzungen gemäß 4.1. erfüllen, werden *auf Antrag* namentlich in einer offiziellen Anwenderliste geführt. Die Anwender werden jeweils für die Dauer eines Kalenderjahres in der Liste geführt. Zur Verlängerung müssen bis 15.12. des Jahres die Anforderungen gemäß 4.2. unaufgefordert nachgewiesen werden. Die Wiederaufnahme ist jedoch für die Anwender, die einmal die Anforderungen gemäß 4.1. erfüllt haben und auf der Liste geführt wurden, innerhalb von 3 Jahren möglich.

Nachgewiesen werden müssen lediglich die Voraussetzungen gemäß 4.2.

Anwender, die länger als 3 Jahre nicht auf der Liste geführt wurden, müssen sämtliche Voraussetzungen gemäß 4.1 erneut nachweisen.

Als Träger der Forschung und Lehre werden Universitäts-Augenkliniken *auf Antrag* des Klinikdirektors auf eine separate Liste der Universitäts-Augenkliniken ohne Nennung des Klinikarztes aufgenommen.

Die Anwenderliste wird alle 3 Monate aktualisiert (31.3., 30.6., 30.9., 31.12.). Sie ist sowohl über die Geschäftsstelle des BVA als auch über die Homepage des BVA im Internet erhältlich.

4.1. Voraussetzungen zur Aufnahme in die Anwenderliste

- Nachweis der Ausbildung gemäß 1.1. der Empfehlungen
- Vorlage einer schriftlichen Erklärung, in der sich der Anwender zur Einhaltung der Qualitätssicherungsempfehlungen verpflichtet (Vordrucke über die KRC erhältlich).

Kommission Refraktive Chirurgie der DOG und des BVA

1. Vorsitzender: Prof. Dr. T. Kohnen **2. Vorsitzender:** Prof. Dr. E. Fabian **Schriftführer:** Prof. Dr. M.C. Knorz

Geschäftsanschrift:

Berufsverband der Augenärzte Deutschlands (BVA) e.V., Stichwort KRC, Postfach 30 01 55, 40401 Düsseldorf
Fon 0211 - 4303700 FAX 0211 - 4303720
e-mail: krc@augeninfo.de
Internet: <http://www.aad.to/krc/>

Kommission Refraktive Chirurgie (KRC)



DOG
Deutsche Ophthalmologische
Gesellschaft
Gesellschaft
für Augenheilkunde

4.2. Voraussetzungen zum Verbleib in der Anwenderliste

- Teilnahme an einem Aufbaukurs bzw. Fortgeschrittenenkurs der KRC pro Kalenderjahr.
- Durchführung der Behandlungen gemäß 2.1 - 2.4. der Empfehlungen. Dies gilt auch für nachgeordnetes Personal sowie den Internetauftritt.

Sollte dies offensichtlich nicht geschehen, wird der Anwender durch die KRC schriftlich um Stellungnahme gebeten. Falls innerhalb von 4 Wochen keine Reaktion erfolgt oder die Stellungnahme der KRC nicht genügt, erfolgt eine Abmahnung, die vom Anwender zu unterschreiben ist. Erfolgt dies nicht oder wird gegen die Abmahnung verstoßen, wird der Anwender ohne weitere Anhörung von der Liste gestrichen. Der Anwender wird hierüber durch die KRC informiert. Eine Neuaufnahme erfolgt frühestens nach drei Jahren und nur *auf Antrag* unter Nachweis aller Voraussetzungen gemäß 4.1.

4.3. Zertifikat

Nach Erfüllung der Voraussetzungen gemäß 4.1. bzw. 4.2. wird auf Antrag ein Zertifikat ausgestellt.

Kommission Refraktive Chirurgie der DOG und des BVA

1. **Vorsitzender:** Prof. Dr. T. Kohnen 2. **Vorsitzender:** Prof. Dr. E. Fabian **Schriftführer:** Prof. Dr. M.C. Knorz

Geschäftsanschrift:

Berufsverband der Augenärzte Deutschlands (BVA) e.V., Stichwort KRC, Postfach 30 01 55, 40401 Düsseldorf
Fon 0211 - 4303700 FAX 0211 - 4303720
e-mail: krc@augeninfo.de
Internet: <http://www.aad.to/krc/>

Qualitätssicherungsempfehlungen Intraokulare Refraktive Chirurgie (Phake IOLs, Refraktiver Linsenaustausch, Laser- Refraktive-Linsenoperation)

1. Strukturqualität

1.1. Persönliche Qualifikation

Die Implantation phaker IOLs und der refraktive Linsenaustausch (RLE) sind augenärztliche invasive operative Eingriffe, die einer besonderen Sachkenntnis bedürfen. Bei der Durchführung sind die allgemeinen Richtlinien der Bundesärztekammer zur Qualitätssicherung ambulanter Operationen einzuhalten. Ferner sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen:

- Teilnahme an einem von der KRC anerkannten und in Zusammenarbeit mit der KRC durchgeführten theoretischen Kurs (Grundkurs und Aufbaukurs)
- Teilnahme an einem von der KRC anerkannten Wet Lab
- Hospitation bei einem von der KRC anerkannten Trainer
- Durchführung der ersten operativen Eingriffe in Anwesenheit eines von der KRC anerkannten Trainers

Die Ausbildung gemäß 1.1. wird durch eine Bescheinigung der KRC bestätigt. Die Ausbildungsempfehlungen gemäß 1.1. gelten für alle Anwender, die namentlich auf die Anwenderliste aufgenommen werden wollen. Voraussetzung ist, dass der Antragsteller über die Anerkennung als Facharzt für Augenheilkunde verfügt.

1.2. Apparative Voraussetzung

- Gemäß § 6 der „Unfallverhütungsvorschrift Laserstrahlung“ ist die Benennung eines Laserschutzbeauftragten erforderlich (falls Laser eingesetzt werden).
- Vor jeder Operation müssen sich die Anwender davon überzeugen, dass die verwendeten Geräte über die zum Einsatz erforderlichen Funktionen verfügen.

1.3. Räumliche Voraussetzungen

- Der Behandlungsraum muss der „Unfallverhütungsvorschrift Laserstrahlung“ entsprechen (falls Laser eingesetzt werden).

Kommission Refraktive Chirurgie der DOG und des BVA

1. Vorsitzender: Prof. Dr. T. Kohnen **2. Vorsitzender:** Prof. Dr. E. Fabian **Schriftführer:** Prof. Dr. M.C. Knorz

Geschäftsanschrift:

Berufsverband der Augenärzte Deutschlands (BVA) e.V., Stichwort KRC, Postfach 30 01 55, 40401 Düsseldorf
Fon 0211 - 4303700 FAX 0211 - 4303720
e-mail: krc@augeninfo.de
Internet: <http://www.aad.to/krc/>

- Die Mindestanforderungen an die bauliche, apparativ-technische und hygienische Ausstattung gemäß Anlage 1 der "Richtlinien der Bundesärztekammer zur Qualitätssicherung ambulanter Operationen" vom 13.4.1994 müssen erfüllt sein.

2. Prozessqualität

2.1. Patientenaufklärung

Jeder Anwender ist zu einer ausführlichen präoperativen Aufklärung des Patienten über den geplanten Eingriff verpflichtet. Die Indikationsstellung muss durch einen auf der KRC – Liste aufgenommenen Facharzt für Augenheilkunde erfolgen. Die Aufklärung muss ein Arzt vornehmen. Da es sich um hoch elektive Eingriffe handelt, müssen regelhaft sowohl die Indikationsstellung als auch die Aufklärung bereits vor dem OP-Tag erfolgen, um eine ausreichende Bedenkzeit zu gewährleisten.

2.2. Präoperative Diagnostik

Die präoperative Diagnostik muss durch einen auf der KRC – Liste aufgenommenen Facharzt für Augenheilkunde erfolgen. Präoperativ sind mindestens folgende Untersuchungen erforderlich und zu dokumentieren:

- Untersuchung der Hornhauttopographie mittels computergestützter Videokeratoskopie
- Prüfung der unkorrigierten und korrigierten Sehschärfe, ggf. nach Ausschaltung der Akkommodation (bei Hyperopie ist unterhalb des 45. Lebensjahres die Bestimmung der subjektiven Refraktion nach Ausschaltung der Akkommodation zwingend erforderlich)
- Messung des Augeninnendruckes
- Messung des mesopischen Pupillendurchmessers (0,05 - 50 Lux)
- Messung der Aniseikonie bei Anisometropie sowie Bestimmung der Verträglichkeit der geplanten Korrektur durch Kontaktlinsen-Trageversuch
- Untersuchung der vorderen und hinteren Augenabschnitte in medikamentöser Mydriasis
- Messung der Vorderkammertiefe
- Messung der Achsenlänge des Auges

Kommission Refraktive Chirurgie der DOG und des BVA

1. Vorsitzender: Prof. Dr. T. Kohnen **2. Vorsitzender:** Prof. Dr. E. Fabian **Schriftführer:** Prof. Dr. M.C. Knorz

Geschäftsanschrift:

Berufsverband der Augenärzte Deutschlands (BVA) e.V., Stichwort KRC, Postfach 30 01 55, 40401 Düsseldorf
Fon 0211 - 4303700 FAX 0211 - 4303720
e-mail: krc@augeninfo.de
Internet: <http://www.aad.to/krc/>

- bei Implantation phaker IOL: Quantitative Untersuchung des Hornhautendothels sowie Darstellung der vorderen Augenabschnitte mittels bildgebender Verfahren (OCT, Scheimpflug-Kamera, Ultraschall)
- Ausschluss medizinischer Kontraindikationen

2.3. Postoperative Diagnostik (siehe auch 3.1.)

Postoperativ sind regelmäßige augenärztliche Kontrolluntersuchungen erforderlich und zu dokumentieren. Diese müssen mindestens umfassen:

- Untersuchung der Hornhauttopographie mittels computergestützter Videokeratoskopie (mindestens einmal innerhalb der ersten 12 postoperativen Monate)
- Prüfung der unkorrigierten und korrigierten Sehschärfe
- Messung des Augeninnendruckes
- Untersuchung der vorderen und hinteren Augenabschnitte
- phake IOLs: Quantitative Untersuchung des Hornhautendothels mindestens 1x pro Jahr

Sind der Operateur und der nachbehandelnde Arzt nicht identisch, muss eine Kooperation für die Nachbehandlung gewährleistet sein.

2.4. Operativer Eingriff

Grundsätzlich sind folgende Mindestvoraussetzungen zu berücksichtigen:

- Lokalanästhesie
- Operation unter aseptischen Bedingungen mit sterilen Instrumenten
- Nachbehandlung mit Antibiotika – und steroidhaltigen Augentropfen

Kommission Refraktive Chirurgie der DOG und des BVA

1. Vorsitzender: Prof. Dr. T. Kohnen **2. Vorsitzender:** Prof. Dr. E. Fabian **Schriftführer:** Prof. Dr. M.C. Knorz

Geschäftsanschrift:

Berufsverband der Augenärzte Deutschlands (BVA) e.V., Stichwort KRC, Postfach 30 01 55, 40401 Düsseldorf
Fon 0211 - 4303700 FAX 0211 - 4303720
e-mail: krc@augeninfo.de
Internet: <http://www.aad.to/krc/>

3. Ergebnisqualität

3.1. Dokumentation

Zur Dokumentation des Behandlungsergebnisses sind mindestens die Befunde und Operationsdaten gemäß der unter 2.2. und 2.3. Untersuchungen festzuhalten.

3.2. Fortbildung

Eine regelmäßige Fortbildung ist erforderlich. Hierzu geeignet ist u.a. der Nachweis der Teilnahme an einem Aufbaukurs bzw. Fortgeschrittenenkurs der KRC pro Kalenderjahr.

4. Anwenderlisten

Alle Anwender, die die Voraussetzungen gemäß 4.1. erfüllen, werden *auf Antrag* namentlich in einer offiziellen Anwenderliste geführt. Die Anwender werden jeweils für die Dauer eines Kalenderjahres in der Liste geführt. Zur Verlängerung müssen bis 15.12. des Jahres die Anforderungen gemäß 4.2. unaufgefordert nachgewiesen werden. Die Wiederaufnahme ist jedoch für die Anwender, die einmal die Anforderungen gemäß 4.1. erfüllt haben und auf der Liste geführt wurden, innerhalb von 3 Jahren möglich.

Nachgewiesen werden müssen lediglich die Voraussetzungen gemäß 4.2. Anwender, die länger als 3 Jahre nicht auf der Liste geführt wurden, müssen sämtliche Voraussetzungen gemäß 4.1 erneut nachweisen.

Als Träger der Forschung und Lehre werden Universitäts-Augenkliniken *auf Antrag* des Klinikdirektors auf eine separate Liste der Universitäts-Augenkliniken ohne Nennung des Klinikarztes aufgenommen.

Die Anwenderliste wird alle 3 Monate aktualisiert (31.3., 30.6., 30.9., 31.12.). Sie ist sowohl über die Geschäftsstelle des BVA als auch über die Homepage des BVA im Internet erhältlich.

4.1. Voraussetzungen zur Aufnahme in die Anwenderliste

- Nachweis der Ausbildung gemäß 1.1. der Empfehlungen
- Vorlage einer schriftlichen Erklärung, in der sich der Anwender zur Einhaltung der Qualitätssicherungsempfehlungen verpflichtet (Vordrucke über die KRC erhältlich).

Kommission Refraktive Chirurgie der DOG und des BVA

1. Vorsitzender: Prof. Dr. T. Kohnen **2. Vorsitzender:** Prof. Dr. E. Fabian **Schriftführer:** Prof. Dr. M.C. Knorz

Geschäftsanschrift:

Berufsverband der Augenärzte Deutschlands (BVA) e.V., Stichwort KRC, Postfach 30 01 55, 40401 Düsseldorf
Fon 0211 - 4303700 FAX 0211 - 4303720
e-mail: krc@augeninfo.de
Internet: <http://www.aad.to/krc/>

4.2. Voraussetzungen zum Verbleib in der Anwenderliste

- Teilnahme an einem Aufbaukurs bzw. Fortgeschrittenenkurs der KRC pro Kalenderjahr.
- Durchführung der Behandlungen gemäß 2.1 - 2.4. der Empfehlungen. Dies gilt auch für nachgeordnetes Personal sowie den Internetauftritt.

Sollte dies offensichtlich nicht geschehen, wird der Anwender durch die KRC schriftlich um Stellungnahme gebeten. Falls innerhalb von 4 Wochen keine Reaktion erfolgt oder die Stellungnahme der KRC nicht genügt, erfolgt eine Abmahnung, die vom Anwender zu unterschreiben ist. Erfolgt dies nicht oder wird gegen die Abmahnung verstoßen, wird der Anwender ohne weitere Anhörung von der Liste gestrichen. Der Anwender wird hierüber durch die KRC informiert. Eine Neuaufnahme erfolgt frühestens nach drei Jahren und nur *auf Antrag* unter Nachweis aller Voraussetzungen gemäß 4.1.

4.3. Zertifikat

Nach Erfüllung der Voraussetzungen gemäß 4.1. wird auf Antrag ein Zertifikat ausgestellt.

Redaktionskomitee:

Prof. Dr. Thomas Kohnen, Frankfurt
Prof. Dr. Ekkehard Fabian, Rosenheim
Prof. Dr. Michael C. Knorz, Mannheim
Prof. Dr. Gerd Auffarth, Heidelberg
Prof. Dr. Gernot I. W. Duncker, Halle/Saale
PD Dr. Daniel Kook, München
Prof. Dr. Markus Kohlhaas, Dortmund
Dr. Kaweh Schayan-Araghi, Dillenburg

Angaben zu den Interessenkonflikten siehe Anhang

Kommission Refraktive Chirurgie der DOG und des BVA

1. Vorsitzender: Prof. Dr. T. Kohnen **2. Vorsitzender:** Prof. Dr. E. Fabian **Schriftführer:** Prof. Dr. M.C. Knorz

Geschäftsanschrift:

Berufsverband der Augenärzte Deutschlands (BVA) e.V., Stichwort KRC, Postfach 30 01 55, 40401 Düsseldorf
Fon 0211 - 4303700 FAX 0211 - 4303720
e-mail: krc@augeninfo.de
Internet: <http://www.aad.to/krc/>